



醫療程序須知

簡介

液態氮治療利用超低溫液態氮將皮膚病灶冷凍。整個凍融循環會令組織壞死及引發免疫作用。

適應症

- 疣
- 珍珠疣
- 光化性角化病

手術 / 程序前須知

1. 可能需要局部麻醉。
2. 可能需要多次治療，而且未必能全部清除。
3. 改善程度並無任何保證，治療反應因人而異。
4. 治療均存在復發機會。
5. 治療前後均需拍照記錄，以作治療進度之參考。

手術 / 程序後須知

1. 治療中及治療後皮膚可能有刺痛的感覺。
2. 治療後皮膚會紅腫、起泡，可能會持續一週。
3. 治療後可能會形成淺層表皮傷口和水泡，可塗搽抗生素藥膏，直至結痂脫落。
4. 每次治療約相隔 2-4 星期。

風險及併發症

1. 泛紅、腫脹、疼痛、起泡、感染、疤痕。
2. 色素沉著或色素減退，可能會持續 3-12 個月或更長時間。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

1. K Soenjoyo et al. Treatment of cutaneous viral warts in children: A review. *Dermatol Ther* 2020.33(6):e14034
2. SKF loo et al. Warts (non-genital). *BMJ Clinical Evidence* 2014.2014:1710

Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____
--

病人簽署：_____ 簽署日期：_____