



醫療程序須知

簡介

脈衝染料激光被血管中的氧合血紅蛋白吸收，選擇性地損傷小血管，對周圍組織的損傷最小。

適應症

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 血管治療 <ul style="list-style-type: none"> ● 葡萄酒色斑 ● 血管瘤 ● 臉部微絲血管擴張 ● 蜘蛛痣 | <ol style="list-style-type: none"> 2. 非血管治療 <ul style="list-style-type: none"> ● 增生性疤痕 ● 發炎性暗瘡 ● 妊娠紋 ● 牛皮癬 |
|--|--|

手術 / 程序前須知

1. 通常不需使用局麻藥。
2. 治療前避免曝曬。
3. 酒精、血液稀釋藥物、維他命或補充劑可能使治療後的瘀傷加重。
4. 可能需要多次治療，而且未必能全部清除。
5. 改善程度並無任何保證，治療反應因人而異。
6. 治療均存在復發機會。
7. 治療前後均需拍照記錄，以作治療進度之參考。

手術 / 程序後須知

1. 治療後幾天避免進行引起過熱的活動：熱水浴、桑拿、劇烈運動。
2. 如有起泡，可塗搽抗生素藥膏。
3. 治療後如沒有傷口可使用無刺激性護膚產品和化妝品。
4. 如沒有傷口，應使用防曬產品及避免接觸陽光。

風險及併發症

1. 治療後可能出現泛紅、腫脹、起泡、感染和結痂。
2. 色素沉著或色素減退，可能持續 3-12 個月或更長時間，視乎皮膚類型。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

1. H Deng et al. Vascularity and thickness changes in immature hypertrophic scars treated with a pulsed dye laser. *Lasers Surg Med* 2021.53:914-921
2. E Forbat et al. Nonvascular uses of pulsed dye laser in clinical dermatology 2019.18:1186-1201
3. LA Brightman et al. Laser treatment of port-wine stains. *Clin Cosmet Invest Dermatol* 2015.8:27-33

病人簽署：_____ 簽署日期：_____

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____