



## 醫療程序須知

### 簡介

微絲血管治療利用長脈衝 1064nm 激光治療皮膚血管性病變。治療過程中，激光被微細血管中的血紅素吸收後轉化為熱能，令血管凝固。

### 適應症

1. 臉部及腳部微絲血管擴張
2. 葡萄酒色斑
3. 血管湖

### 手術 / 程序前須知

1. 通常不需要局部麻醉。
2. 可能需要多次治療，而且未必能全部清除。
3. 改善程度並無任何保證，治療反應因人而異。
4. 治療均存在復發機會。
5. 治療前後均需拍照記錄，以作治療進度之參考。

### 手術 / 程序後須知

1. 治療後可能引起暫時的灼熱感。
2. 皮膚會出現紅腫，可能持續 1-4 星期或更長時間。
3. 色素沉著或瘀傷，可能持續 3-12 個月或更長時間。
4. 如有起泡或傷口，可塗搽抗生素藥膏。
5. 如沒有傷口，應使用防曬產品及避免接觸陽光。

### 風險及併發症

1. 泛紅、腫脹、瘀傷、起泡、結痂，感染。
2. 色素沉著或色素減退。
3. 疤痕凹陷或疤痕增生。

### 免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

### 參考資料

1. J S Dover et al. New approaches to the treatment of vascular lesions. *Lasers Surg Med* 2000.26(2):158-163
2. K Ozyurt et al. Treatment of superficial cutaneous vascular lesions: Experience with the long-pulsed 1064nm Nd:YAG laser. *The Scientific World Journal* 2012. Article ID 197139

<p><b>Patient's Label</b> Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p>
--

病人簽署：\_\_\_\_\_ 簽署日期：\_\_\_\_\_