



醫療程序須知

簡介

醫生如懷疑病人患有前列腺癌，會建議進行經會陰超聲波掃描前列腺穿刺活組織檢查。這是診斷前列腺癌的介入性檢查，惟即使結果呈陰性，亦無法完全排除患前列腺癌的可能性。

手術 / 程序過程

病人在進行經會陰超聲波掃描前列腺穿刺活組織檢查前，會獲發清空直腸藥物及預防性抗生素。醫生會把超聲波探頭放入病人直腸，透過會陰取得多份前列腺活組織。

手術 / 程序前須知

1. 請告知醫生任何醫療狀況(例如糖尿病、心臟病、高血壓)及任何你正服用的藥物(例如阿司匹林及血液稀釋劑，可能需要於術前停止服用一段時間)。
2. 病人經醫生解釋程序過程及風險，閱讀程序須知，簽署手術同意書。
3. 程序前需檢查血凝結率，如有問題需要先矯正。
4. 為防止出血之併發症，病人可能須要數天前停止服用阿斯匹靈或其他防止血凝固之藥物。
5. 遵醫囑術前及術後均要服抗生素以預防細菌感染。
6. 程序前病人會作灌腸以清除排泄物及空氣。
7. 醫生會在程序時給與病人鎮靜劑或鎮痛劑。
8. 往檢查前應更換手術袍、手術襪及手術帽，然後除去內衣褲及假牙，隱形眼鏡及飾物(包括髮夾耳環及介指等)。
9. 往檢查前需排空膀胱。

手術 / 程序後須知

1. 程序後可能有輕微痛楚，首兩天有血尿及大便有血等，數天後會消失，多飲清水可幫助排尿。若出血量增加或有發燒、寒顫及尿瀦留等現象，請即通知醫生。
2. 病人需按醫生指示於程序後繼續口服抗生素。
3. 服用抗凝血藥者，請向醫生查詢何時恢復服藥，如亞司匹靈(Aspirin)。
4. 無需戒口，可如常飲食和活動。

Patient's Label

Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____



風險及併發症

1. 可致命的敗血症(0.1%)
2. 尿道感染 (1%)
3. 血尿 (可能持續10天)
4. 血精 (可能持續6星期)
5. 排尿困難 / 尿瀦留 (5%)
6. 會陰輕微瘀傷或腫脹(10%)

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

醫院管理局外科協調委員會：經會陰超聲波引導前列腺活組織檢查(2018)

病人簽署：_____ 簽署日期：_____

Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____
--