

简介

病人如需要接受动脉或静脉注射造影剂检查，医生会注射造影剂入动脉或静脉，然后用 X 光检查。加入造影剂的检查会比较清晰，医生从而比较清楚看到病人异常的情况。一般来说，造影剂是一种安全的药物，但间中亦会引起副作用。医生相信这项检查是必须的，因为它所提供的资料有助加深了解病情及诊治。

风险及并发症

一般而言，造影剂是很安全的，但偶有并发症出现。

一般风险：

- **轻微反应：**包括痕痒、作呕、热暖感觉、手痛、打喷嚏、咳嗽及少许呼吸困难。部份病人会较迟才有反应，通常会 24 小时内感到注射造影剂的静脉注射位痛楚、痕痒、红疹或唾液腺有肿胀。此等症状维持短暂，不需或只需少许治疗。
- **中度反应：**反应症状比较严重及维持比较长时间。病人会有红疹，发烧，寒颤，血压上升或下降，心悸。需要特别治疗及观察。
- **严重反应：**反应包括气促，心律不齐，心绞痛，急性肾衰竭，抽搐及昏迷。如有此等反应，必须立即治疗。

特别风险：

- 经静脉注射造影剂时，有机会发生显影剂外渗的情况，病人会感到静脉注射位置极为不适或痛楚，需要观察及治疗。
- 若出现呕吐现象，胃内之口服造影剂有可能被吸入肺部，需要观察。
- 病人对造影剂敏感而导致死亡的个案非常罕见。

免责声明

本单张只提供有关程序的基本资料，并列出常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

医管局「智友站」网页：显影造影剂的电脑扫描检查接(v2/2020)

Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____
--

病人签署： _____ 日期： _____