



腹膜腔穿刺放液术(需要时施行引流术) Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping (and Drainage if necessary)

医疗程序须知

简介

腹腔穿刺术是一项简单的程序,用于移除腹腔积液(腹水)。在正常情况腹腔里只会有少量的液体存在。 当液体在腹腔中累积 (即腹水),可进行腹腔穿刺术引出腹水。

适应症

- 诊断用途:抽取之腹水可作化验、确定成因。
- 治疗用途:引出聚积过多的腹水以舒缓相关的腹胀、胀气、腹痛和呼吸困难。

手术 / 程序过程

- 1. 病人需平躺或侧卧于床上以便配合抽取腹水或引流。
- 2. 医生会先在施针的位置进行皮肤消毒。
- 3. 然后医生会在下针的位置施加局部麻醉药。
- 4. 待药力生效后, 随即将刺针/引流管经皮肤插进入腹腔, 并用针筒抽取腹水。
- 5. 医生会抽出适量的腹水,以达到检查或治疗的目的。

手术 / 程序前须知

- 1. 病人需签署手术同意书。
- 2. 于程序前小便。

手术 / 程序后须知

- 1. 检查完成后,病人需遵医嘱在床上休息。
- 2. 医护人员将紧密监察病人之血压、脉搏、以观察并发症有否出现。

风险及并发症

一般来说,这是一个风险相对较低的检查。罕见但严重的并发症,包括腹水渗漏(5%)、严重内出血(0-0.97%)、感染(0.58-0.63%)、腹腔穿刺术相关的死亡(0-0.39%)。

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料, 并列出常见的风险或并发症; 可能发生的风险或并发症不能尽录, 亦可因人而异。如需详细资料或个别查询, 请联络你的医生。

参考资料

Runyon, B. A., Chopra, S. & Robson, K. M. (2021). Diagnostic and therapeutic abdominal paracentesis. *UpToDate*. Retrieved from

https://www.uptodate.com/contents/diagnostic-and-therapeutic-abdominal-paracentesis?source=history_widget#H337673812

		Patient's Label	
		Patient Name:	
		Hospital No:	
☆ 	发黑口细 .	Episode No:	
病人签署:	签署日期:		
		L	

