



医疗程序须知

简介

硅油用于手术，如视网膜撕裂；其作用是抑制出血或帮助视网膜回复正常位置。硅油一般在三个月后移除，当视网膜已依附正常位置或当发生油状乳化、带状角膜病变、继发性青光眼或白内障。

适应症

1. 稳定或改善病人眼疾状况
2. 减低硅油填补料导致相关并发症的风险

手术 / 程序过程

1. 一般情况下可局部麻醉下施行。
2. 医生会在巩膜即眼白部份切开数个小孔，吸出硅油。

手术 / 程序前须知

1. 保持眼皮清洁以减低手术后发炎机会。
2. 手术前依处方服用药物或滴眼药水。
3. 手术当天不宜化妆。
4. 如你有内科病如高血压、中风、心脏病、糖尿病、排尿障碍等，或长期需要服西药（如薄血丸，抗凝血剂）、中药或健康食品等，请预早通知医生。

手术 / 程序后须知

1. 避免揉眼。
2. 手术后数星期不宜游泳或做剧烈运动。
3. 在手术后首周避免污水接触眼睛。
4. 手术后数星期，宜穿着扣钮衣服及避免穿过头衣服，以避免衣服触及眼睛而引致发炎。
5. 你必须按照医生的指示用药，并于预定的日期覆诊。
6. 手术后初期可能需要俯卧或尽量使面向下及不能乘搭飞机
7. 如手术后有以下征状，则应尽快联络你的医生、眼科中心或门诊部求诊：
 - 眼睛大量出血
 - 剧烈痛楚
 - 发烧
 - 眼睛出现发炎征象，例如：伤口红肿发炎、或伤口分泌物有恶臭等。

「 Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____

」

」



风险及并发症

一般手术风险如下:

- 感染、出血、发炎、眼部不适或疼痛
- 伤口愈合不良或相关并发症、结疤
- 眼睑及结膜肿胀
- 流眼水
- 需重复接受手术或接受进一步手术/程序
- 眼疾复发或病情不受控制

重要风险及并发症包括:

- 硅油填补料残留眼内
- 视网膜再次脱落
- 眼压过高或过低、视野缺损、屈光不正
- 晶体受损、白内障恶化、无晶状体畸形、人工晶体脱位或松脱、晶体后囊混浊
- 黄斑点水肿及纤维化、视网膜血管闭塞、角膜水肿及细胞损伤、巩膜刺穿
- 眼睑下垂
- 对局部麻醉药过敏
- 眼球后出血
- 眼内炎
- 脉络膜上腔出血
- 眼球萎缩
- 交感性眼炎
- 失明、永久丧失视力

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

Issa, R., Xia, T., Zarbin, M. A., & Bhagat, N. (2020). Silicone oil removal: post-operative complications. *Eye (London, England)*, 34(3), 537–543. <https://doi.org/10.1038/s41433-019-0551-7>

医院管理局 2019 年 1 月 接受手术/医疗程序/治疗同意书:硅油移除。

病人签署: _____ 签署日期: _____

<p>Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p>
--