



医疗程序须知

简介

地塞米松玻璃体内注射植入物(Ozurdex®) 是一种局部注射式的类固醇，能将药物直接传递到眼球内，能治疗葡萄膜炎、视网膜静脉阻塞及黄斑水肿，药物会在注射后的4至6个月内缓慢释放，以改善或稳定视力。

与口服或血管内注射类固醇比较，局部注射式类固醇可以减低类固醇在身体其他部分的副作用。

病人于植入药物后须定期覆诊观察病情，数月后可能需要再次接受注射以保持治疗效果。由于部份病人眼睛可能已被本身眼疾导致视力永久伤害，注射类固醇后未必能改善视力，也有机会继续下降。

适应症

1. 葡萄膜炎。
2. 视网膜静脉阻塞性黄斑水肿。
3. 糖尿病性黄斑水肿。

手术 / 程序过程

1. 一般情况下可局部麻醉下施行。
2. 病人于注射前须使用扩大瞳孔、局部麻醉药及抗生素眼药水。
3. 玻璃体内注射过程必须在无菌条件下进行，医生利用针筒将药物透过「眼白」注射到玻璃体内。

手术 / 程序前须知

1. 保持眼皮清洁以减低手术后发炎机会。
2. 手术前依处方服用药物或滴眼药水。
3. 手术当天不宜化妆。
4. 如你有内科病如高血压、中风、心脏病、糖尿病、排尿障碍等，或长期需要服西药（如薄血丸，抗凝血剂）、中药或健康食品等，请预早通知医生。

手术 / 程序后须知

1. 避免揉眼。
2. 手术后数星期不宜游泳或做剧烈运动。
3. 在手术后首周避免污水接触眼睛。

<p>Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p>



4. 手术后数星期，宜穿着扣钮衣服及避免穿过头衣服，以避免衣服触及眼睛而引致发炎。
5. 你必须按照医生的指示用药，并于预定的日期覆诊。

风险及并发症

一般并发症如下：

1. 感染、出血、发炎或流眼水
2. 眼球充血、眼部不适或疼痛
3. 结疤、眼睑及结膜肿胀
4. 飞蚊增加
5. 短暂性眼红
6. 眼部不适
7. 眼压升高或青光眼
8. 白内障恶化
9. 眼睛及注射部位周边组织感染

重要风险/并发症如下：

较严重的并发症可引至永久视力损失或失明，例如：

1. 视网膜穿洞或脱离
2. 眼内发炎或感染
3. 晶体创伤或白内障形成
4. 眼压增升(青光眼)
5. 注射部位伤口渗漏
6. 眼内部出血

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

医院管理局，病人资料单张：地塞米松玻璃体内注射植入物Dexamethasone Intravitreal Implant (Ozurdex®) (4/2021)

病人签署： _____ 签署日期： _____

<p>Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p>
