



医疗程序须知

简介

液态氮治疗利用超低温液态氮将皮肤病灶冷冻。整个冻融循环会令组织坏死及引发免疫作用。

适应症

- 疣
- 珍珠疣
- 光化性角化病

手术 / 程序前须知

1. 可能需要局部麻醉。
2. 可能需要多次治疗，而且未必能全部清除。
3. 改善程度并无任何保证，治疗反应因人而异。
4. 治疗均存在复发机会。
5. 治疗前后均需拍照记录，以作治疗进度之参考。

手术 / 程序后须知

1. 治疗中及治疗后皮肤可能有刺痛的感觉。
2. 治疗后皮肤会红肿、起泡，可能会持续一周。
3. 治疗后可能会形成浅层表皮伤口和水泡，可涂搽抗生素药膏，直至结痂脱落。
4. 每次治疗约相隔 2-4 星期。

风险及并发症

1. 泛红、肿胀、疼痛、起泡、感染、疤痕。
2. 色素沉着或色素减退，可能会持续 3-12 个月或更长时间。

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

1. K Soenjoyo et al. Treatment of cutaneous viral warts in children: A review. *Dermatol Ther* 2020.33(6):e14034
2. SKF loo et al. Warts (non-genital). *BMJ Clinical Evidence* 2014.2014:1710

Patient's Label	
Patient Name: _____	
Hospital No: _____	
Episode No: _____	

病人签署: _____ 签署日期: _____