



医疗程序须知

简介

医生如怀疑病人患有前列腺癌，会建议进行经会阴超声波扫描前列腺穿刺活组织检查。这是诊断前列腺癌的介入性检查，惟即使结果呈阴性，亦无法完全排除患前列腺癌的可能性。

手术 / 程序过程

病人在进行经会阴超声波扫描前列腺穿刺活组织检查前，会获发清空直肠药物及预防性抗生素。医生会把超声波探头放入病人直肠，透过会阴取得多份前列腺活组织。

手术 / 程序前须知

1. 请告知医生任何医疗状况(例如糖尿病、心脏病、高血压)及任何你正服用的药物(例如阿司匹林及血液稀释剂，可能需要于术前停止服用一段时间)。
2. 病人经医生解释程序过程及风险，阅读程序须知，签署手术同意书。
3. 程序前需检查血凝结率，如有问题需要先矫正。
4. 为防止出血之并发症，病人可能须要数天前停止服用阿斯匹灵或其他防止血凝固之药物。
5. 遵医嘱术前及术后均要服抗生素以预防细菌感染。
6. 程序前病人会作灌肠以清除排泄物及空气。
7. 医生会在程序时给与病人镇静剂或镇痛剂。
8. 往检查前应更换手术袍、手术袜及手术帽，然后除去内衣裤及假牙，隐形眼镜及饰物(包括发夹、耳环及介指等)。
9. 往检查前需排空膀胱。

手术 / 程序后须知

1. 程序后可能有轻微痛楚，首两天有血尿及大便有血等，数天后会消失，多饮清水可帮助排尿。若出血量增加或有发烧、寒颤及尿潴留等现象，请即通知医生。
2. 病人需按医生指示于程序后继续口服抗生素。
3. 服用抗凝血药者，请向医生查询何时恢复服药，如亚司匹灵(Aspirin)。
4. 无需戒口，可如常饮食和活动。

Patient's Label

Patient Name: _____
Hospital No: _____
Episode No: _____



风险及并发症

1. 可致命的败血症(0.1%)
2. 尿道感染 (1%)
3. 血尿 (可能持续10天)
4. 血精 (可能持续6星期)
5. 排尿困难 / 尿潴留 (5%)
6. 会阴轻微瘀伤或肿胀(10%)

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料, 并列出现见的风险或并发症; 可能发生的风险或并发症不能尽录, 亦可因人而异。如需详细资料或个别查询, 请联络你的医生。

参考资料

医院管理局外科协调委员会 : 经会阴超声波引导前列腺活组织检查(2018)

病人签署: _____ 签署日期: _____

<p>Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p>
