



医疗程序须知

简介

乳腺癌有可能会从乳腺扩散至腋下淋巴结。此手术可诊断和治疗腋下淋巴结病变转移的情况。

另外，如前哨淋巴(结)切除术后(Sentinel Lymph Node Excision / Biopsy)，其组织化验报告证实有扩散迹象，则需再施行此手术。

适应症

乳癌

手术 / 程序过程

1. 在全身麻醉下进行。
2. 腋下淋巴切除术 / 清除术，一般与保留乳房切除术或简单(单纯)性乳房切除术同时进行。
3. 如施行保留乳房切除术，会在患侧腋下开一切口，切口位于在腋下皮肤褶皱处；如施行乳房切除术，则使用同一切口。
4. 切除腋下第一及二组淋巴结组织。
5. 放入一条引流喉管连接真空引流瓶，以排出伤口积血和积液。
6. 以缝线缝合伤口及固定引流喉管。

手术 / 程序前须知

与保留乳房切除术或乳房切除术同。

手术 / 程序后须知

与保留乳房切除术或乳房切除术同。

风险及并发症

1. 伤口疼痛。
2. 伤口感染。
3. 出血(可能须要再次进行手术以清除血块)。
4. 疤痕增生或疙瘩，可能会造成难看的疤痕。
5. 淋巴性水肿
6. 神经受损，其中包括：胸长神经、胸背神经及罕见的臂神经丛受损。
7. 血管受损。
8. 冻肩症及慢性僵硬。
9. 腋下麻木。
10. 伤区积液。

其他治疗 / 检查方法

前哨淋巴(结)切除术

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

1. 医院管理局「智友站」网页：腋下淋巴切除手术(2020)
2. 医院管理局乳腺外科护理咨询小组资料单张：
乳房护理系列 - 腋下淋巴结切除手术(2021)

病人签署：_____ 签署日期：_____

Patient's Label	
Patient Name: _____	
Hospital No: _____	
Episode No: _____	