



医疗程序须知

简介

该程序是以腹腔镜技术移除卵巢囊肿或输卵管卵巢。

适应症

- 卵巢囊肿
- 其他

手术 / 程序过程

1. 全身麻醉，在腹部制造切口前，先注入二氧化碳使腹腔形成气腹。
2. 将腹腔镜及其它仪器置入腹腔 +/- 子宫。
3. 作卵巢囊肿切除术 / 输卵管卵巢切除术。
4. 将切除组织放入袋后经腹部切口再移去。
5. 样本亦可经由阴道取出，然后缝合。
6. 腹部（及阴道）伤口缝合。
7. 除非特别声明，所有取出的组织会送交病理化验部或依惯常程序处理。

手术 / 程序前须知

1. 需签署手术同意书。
2. 于手术前六小时开始禁饮食。
3. 可能需要剃掉腹部及耻骨联合毛发。
4. 清洁肚脐：
 - 4.1 用沾湿了肥皂液的棉花棒彻底清洁肚脐内部；
 - 4.2 棉花棒由内至外清洗肚脐，将污秽尽量清除。
5. 按医嘱作肠道预备。
6. 除去身上所有衣物（包括内衣裤）和物品，例如假牙、饰物和隐形眼镜等，换上手术衣着。
7. 往手术室前先排清小便。

手术 / 程序后须知

1. 全身麻醉后，病人或会感到疲倦、渴睡、恶心及呕吐，如情况持续或加剧，请通知医护人员。
2. 病人会于手术后感到腹胀。
3. 由于只有三至四个微细腹部伤口，故痛楚会较开腹切除者少，复康期也加快，住院亦较短。
4. 若正常卵巢组织得以保存，荷尔蒙分泌不受影响。
5. 可能影响生殖能力。
6. 有机会复发，特别是子宫内膜异位。
7. 若同时切除双侧卵巢，可能需要服用荷尔蒙，其副作用包括增加患乳癌及胆石的机会。
8. 恶性病变可能需要跟进治疗。

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____



腹腔镜卵巢囊肿切除术 与开腹手术相同处

1. 相同病理组织切除。
2. 相同病理后果。

腹腔镜卵巢囊肿切除术 风险及并发症

肥胖、过瘦、病情严重、曾进行过手术或有其他疾病者必须明白手术引致严重或常见并发症的风险将会增加。

1. 麻醉并发症。
2. 损伤附近器官例如肠道；膀胱、输尿管、子宫、阴道或主要血管而要进行腹腔镜修手术或开腹；有些损伤未必能在手术期间发现。
3. 因失血而需要输血及因输血而带来的风险。
4. 因出血、伤口裂开等并发症要重回手术室。
5. 伤口并发症如出血、感染、瘀青、延迟愈合、疤痕增生、疼痛、麻痹、小肠气。
6. 盆腔感染。
7. 内腔器官粘连。
8. 肩部疼痛。
9. 血栓栓塞并发症如深部静脉栓塞及肺动脉栓塞。
10. 每十万名妇女有三到八名因腹腔镜手术并发症而死。

腹腔镜卵巢囊肿切除术 不接受手术的风险

1. 卵巢囊肿可能产生并发症（如扭转、出血、破裂）。
2. 未能及早作出诊断；卵巢囊肿是否恶性须在切除后化验才确定。

其他治疗 / 检查方法

1. 腹腔镜囊肿切除术或输卵管卵巢切除术。
2. 腹腔镜双侧输卵管卵巢切除。
3. 腹腔镜辅助阴道子宫双侧输卵管卵巢切除。
4. 剖腹术。
5. 其它 _____

Patient's Label

Patient Name: _____

Hospital No: _____

Episode No: _____




免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料, 并列出现常见的风险或并发症; 可能发生的风险或并发症不能尽录, 亦可因人而异。如需详细资料或个别查询, 请联络你的医生。

参考资料

基督教联合医院妇产科手术前资料: 腹腔镜卵巢囊肿切除 / 腹腔镜输卵管卵巢切除 (2022)



<p>Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p>
--

病人签署: _____ 签署日期: _____