



医疗程序须知

简介

类固醇注射是治疗肥大性疤痕和蟹足肿的一种方法。通常需要配合其他治疗一同使用，例如硅胶、激光治疗和外科手术，以达致更佳效果。现今没有任何治疗可以令疤痕完全消失，疤痕治疗的目的是加速疤痕的成熟并改善疤痕的外观。

适应症

肥厚性疤痕、蟹足肿和手术后疤痕的预防治疗。

禁忌症

皮肤感染，对类固醇过敏，怀孕。如身体有炎症，消化性溃疡，血糖不稳定，心脏衰竭，严重高血压的患者和血凝固症患者，应小心使用类固醇。

手术 / 程序前须知

1. 可能需要局部麻醉。
2. 可能需要多次治疗，而且未必能全部清除。
3. 改善程度并无任何保证，治疗反应因人而异。
4. 治疗均存在复发机会。
5. 治疗前后均需拍照记录，以作治疗进度之参考。

手术 / 程序后须知

1. 治疗后可恢复使用护肤产品和化妆品。
2. 每次治疗约相隔 2 - 6 星期。

风险及并发症

1. 注射部位周围疼痛、瘀青、痕痒。
2. 皮肤萎缩：皮肤变薄、微细血管扩张或色素减退。

<p>Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Episode No: _____</p>
--

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出现常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

1. Y I Lee et al. Combined therapeutic strategies for keloid treatment. *Derm Surg* 2019;45(6):802-810
2. M H Gold et al. Updated international clinical recommendations on scar management: Part 1 - Evaluating the evidence. *Derm Surg* 2014;40(8): 817 - 824
3. M H Gold et al. Updated international clinical recommendations on scar management: Part 2 - Evaluating the evidence. *Derm Surg* 2014;40(8): 825 - 831

病人签署：_____ 签署日期：_____