香港浸信會醫院
Hong Kong Baptist Hospital

皮膚疤痕注射類固醇
Intralesional Steroid Injection

皮膚疤痕注射類固醇 Intralesional Steroid Injection

醫療程序須知

簡介

類固醇注射是治療肥大性疤痕和蟹足腫的一種方法。通常需要配合其他治療一同使用，例如矽膠、激光治療和外科手術，以達致更佳效果。現今沒有任何治療可以令疤痕完全消失，疤痕治療的目的是加速疤痕的成熟並改善疤痕的外觀。

適應症

肥厚性疤痕、蟹足腫和手術後疤痕的預防治療。

禁忌症

皮膚感染，對類固醇過敏，懷孕。 如身體有炎症，消化性潰瘍，血糖不穩定，心臟衰竭，嚴重高血壓的患者和血凝固症患者，應小心使用類固醇。

手術 / 程序前須知

1. 可能需要局部麻醉。
2. 可能需要多次治療，而且未必能全部清除。
3. 改善程度並無任何保證，治療反應因人而異。
4. 治療均存在復發機會。
5. 治療前後均需拍照記錄，以作治療進度之參考。

手術 / 程序後須知

1. 治療後可恢復使用護膚產品和化妝品。
2. 每次治療約相隔 2 - 6 星期。

風險及併發症

1. 注射部位周圍疼痛、瘀青、痕癢。
2. 皮膚萎縮：皮膚變薄、微細血管擴張或色素減退。

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No:_____
Episode No:_____

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

1. Y I Lee et al. Combined therapeutic strategies for keloid treatment. Derm Surg 2019.45(6):802-810
2. M H Gold et al. Updated international clinical recommendations on scar management: Part 1 – Evaluating the evidence. Derm Surg 2014.40(8): 817 – 824
3. M H Gold et al. Updated international clinical recommendations on scar management: Part 2 – Evaluating the evidence. Derm Surg 2014.40(8): 825 – 831

病人簽署：_____ 簽署日期：_____