



医疗程序须知

简介

微丝血管治疗利用长脉冲 1064nm 激光治疗皮肤血管性病変。治疗过程中，激光被微细血管中的血红素吸收后转化为热能，令血管凝固。

适应症

1. 脸部及脚部微丝血管扩张
2. 葡萄酒色斑
3. 血管湖

禁忌症

- 怀孕、光敏感性疾病，例如：系统性红斑狼疮，紫质症和诱发光敏感性的药物。
- 最近曾经曝晒或有疤痕增生倾向患者应谨慎使用此激光。

手术 / 程序前须知

1. 通常不需要局部麻醉。
2. 可能需要多次治疗，而且未必能全部清除。
3. 改善程度并无任何保证，治疗反应因人而异。
4. 治疗均存在复发机会。
5. 治疗前后均需拍照记录，以作治疗进度之参考。

手术 / 程序后须知

1. 治疗后可能引起暂时的灼热感。
2. 皮肤会出现红肿，可能持续 1-4 星期或更长时间。
3. 色素沉着或瘀伤，可能持续 3-12 个月或更长时间。
4. 如有起泡或伤口，可涂擦抗生素药膏。
5. 如没有伤口，应使用防晒产品及避免接触阳光。

风险及并发症

1. 泛红、肿胀、瘀伤、起泡、结痂，感染。
2. 色素沉着或色素减退。
3. 疤痕凹陷或疤痕增生。

| |
|---|
| <p>Patient's Label Patient Name: _____ Hospital No: _____ Adm No/Episode No: _____</p> |
|---|

免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

参考资料

1. J S Dover et al. New approaches to the treatment of vascular lesions. Lasers Surg Med 2000.26(2):158-163
2. K Ozyurt et al. Treatment of superficial cutaneous vascular lesions: Experience with the long-pulsed 1064nm Nd:YAG laser. The Scientific World Journal 2012. Article ID 197139

病人签署：_____ 签署日期：_____