



## 医疗程序须知

### 简介

二氧化碳激光产生的波长为 10,600 nm，可以精确地切割表层皮肤或消除不需要的组织。

### 适应症

1. 脂溢性角化病、晒斑、疣、珍珠疣、皮角、光化性角化病、汗管瘤、皮脂腺增生、痣、黄斑瘤。
2. 毛细血管扩张、化脓性肉芽肿、樱桃血管瘤。
3. 疤痕。

### 禁忌症

- 怀孕、光敏感性疾病，例如：系统性红斑狼疮，紫质症和诱发光敏感性的药物。
- 最近曾经曝晒或有疤痕增生倾向患者应谨慎使用此激光。

### 手术 / 程序前须知

1. 可能需要局部麻醉。
2. 可能需要多次治疗，而且未必能全部清除。
3. 改善程度并无任何保证，治疗反应因人而异。
4. 治疗均存在复发机会。
5. 治疗前后均需拍照记录，以作治疗进度之参考。

### 手术 / 程序后须知

1. 治疗后皮肤会红肿，可能会持续几天至一周。
2. 治疗后可能结痂，约 1-2 周才能脱落。
3. 结痂脱落后，皮肤会变成粉红色或红色，可能需要 1-6 个月才能减退。
4. 治疗后可能会出现变黑或变白情况，在面部可能需要 1-6 个月才能减退；在身体部位或需更长时间，亦有可能永久不退，但这情况很罕见。
5. 涂搽抗生素药膏，直至结痂脱落。
6. 结痂脱落后，可恢复使用护肤产品和化妆品。
7. 应使用防晒产品及避免接触阳光。

### 风险及并发症

1. 泛红、肿胀、瘀伤、出血、感染、痕痒。
2. 色素沉着或色素减退。
3. 疤痕。

### 免责声明

本单张只提供有关手术 / 程序的基本资料，并列出常见的风险或并发症；可能发生的风险或并发症不能尽录，亦可因人而异。如需详细资料或个别查询，请联络你的医生。

### 参考资料

1. FDA approved indications for use (FORM FDA 3881) June 2015.
2. [https://www.accessdata.fda.gov/cdrh\\_docs/pdf15/K151331.pdf](https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf15/K151331.pdf)

### Patient's Label

Patient Name: \_\_\_\_\_  
Hospital No: \_\_\_\_\_  
Episode No: \_\_\_\_\_

病人签署: \_\_\_\_\_ 签署日期: \_\_\_\_\_