香港浸信會醫院
Hong Kong Baptist Hospital

二氧化碳激光治療
CO2 Laser

醫療程序須知

簡介

二氧化碳激光產生的波長為 10,600 nm，可以精確地切割表層皮膚或消除不需要的組織。

適應症

1. 脂溢性角化病、曬斑、疣、珍珠疣、皮角、光化性角化病、汗管瘤、皮脂腺增生、痣、黃斑瘤。
2. 毛細血管擴張、化膿性肉芽腫、櫻桃血管瘤。
3. 疤痕。

禁忌症

- 懷孕、光敏感性疾病，例如：系統性紅斑狼瘡，紫質症和誘發光敏感性的藥物。
- 最近曾經曝曬或有疤痕增生傾向患者應謹慎使用此激光。

手術 / 程序前須知

1. 可能需要局部麻醉。
2. 可能需要多次治療，而且未必能全部清除。
3. 改善程度並無任何保證，治療反應因人而異。
4. 治療均存在復發機會。
5. 治療前後均需拍照記錄，以作治療進度之參考。

手術 / 程序後須知

1. 治療後皮膚會紅腫，可能會持續幾天至一週。
2. 治療後可能結痂，約 1-2 週才能脫落。
3. 結痂脫落後，皮膚會變成粉紅色或紅色，可能需要 1-6 個月才能減退。
4. 治療後可能會出現變黑或變白情況，在面部可能需要 1-6 個月才能減退；在身體部位或需更長時間，亦有可能永久不退，但這情況很罕見。
5. 塗搽抗生素藥膏，直至結痂脫落。
6. 結痂脫落後，可恢復使用護膚產品和化妝品。
7. 應使用防曬產品及避免接觸陽光。

風險及併發症

1. 泛紅、腫脹、瘀傷、出血、感染、痕癢。
2. 色素沉著或色素減退。
3. 疤痕。

免責聲明

本單張只提供有關手術 / 程序的基本資料，並列出常見的風險或併發症；可能發生的風險或併發症不能盡錄，亦可因人而異。如需詳細資料或個別查詢，請聯絡你的醫生。

參考資料

1. FDA approved indications for use (FORM FDA 3881) June 2015.
2. https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf15/K151331.pdf

Patient's Label
Patient Name: _____
Hospital No:_____
Episode No:_____

病人簽署：_____ 簽署日期：_____